



EXCELENTE ACCIÓN BOTRITICIDA

Fungicida Agrícola

Suspensión Concentrada - SC

Registro Nacional ICA No. 1583

Ingredientes activos:

Pyrimethanil: 250 g/L

Iprodione: 125 g/L

ALGUACIL[®] SC es un fungicida con efecto translaminar y de contacto, de acción preventiva y curativa. ALGUACIL[®] SC combina dos mecanismos de acción; Pyrimethanil inhibe la secreción de enzimas necesarias en el hongo requeridas para el proceso infectivo en la planta. Iprodione, inhibe diferentes fases del ciclo del hongo, como la germinación y producción de conidias, elongación del tubo germinativo y crecimiento del micelio.

CULTIVOS	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	P.R.
Arveja	Botrytis (<i>Botryotinia fuckleliana (de bary)</i>)	0.8 L/ha	15 días	12 horas
Cebolla, Cebolla larga o Junca*, Puerro*	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.6 L/ha	14 días	
Fresa, Mora*, Uva*	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.8 - 1.0 L/ha	3 días	
Rosas, Clavel y Crisantemo	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 L/ha	No aplica	
Tomate, Berenjena*, Aji*, Pimentón*, Uchuva*, Tomate de árbol*, Lulo*	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.8 L/ha	3 días	

* Según resolución ICA No. 4754 de 2011.

- ▶ Se puede realizar una segunda aplicación de ALGUACIL[®] SC si el grado de infección lo amerita.
- ▶ Para una mayor efectividad de ALGUACIL[®] SC, aplicar con **POTENZOL[®] 3000 SL** y para regular el pH y la dureza del agua usar **POTENZOL[®] pH-D**.