



ACCIÓN INSECTICIDA Y ACARICIDA

Insecticida Agrícola

Concentrado Emulsionable - EC

Registro Nacional ICA No. 946

Ingrediente activo:

Abamectina: 18 g/L

CANDONGA[®] 1.8 EC insecticida acaricida de contacto y estomacal que actúa principalmente sobre los receptores del ácido aminobutírico, el cual es un neurotransmisor asociado con el bloqueo de los impulsos nerviosos.

CULTIVOS	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	P.R.
Rosas	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.35 ml/l de agua para un volumen total de 1200 Lts de agua/ha equivalente a una dosis de 0.420 Lts de producto/ha.	No aplica	4 horas
Naranja	Ácaros (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	0.30 - 0.45 Lts/ha	10 días	
Uchuva	Ácaros (<i>Aculops spp</i>) (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	0.45 ml/l de agua para un volumen total de 800 Lts de agua/ha equivalente a una dosis de 0.360 Lts de producto/ha.	3 días	
	Gusano cogollero (<i>Tuta absoluta</i>)	0.5 - 0.6 L/ha	14 días	
Frijol	Minador (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	0.6 L/ha		
	Minador (<i>Liriomyza trifolii</i>)	0.6 L/ha	14 días	
Tomate	Minador (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	0.6 L/ha	3 días	
Berenjena	Gusano cogollero (<i>Tuta absoluta</i>)	0.5 - 0.6 L/ha	14 días	
Pimentón	Minador de la hoja (<i>Leucoptera coffeella</i>)	0.55 L/ha		
Café	Arañita roja (<i>Oligonychus yothersi</i>)	0.6 L/ha	14 días	
	Arañita roja (<i>Oligonychus yothersi</i>)	0.4 L/ha	14* días	

* Consulte a su asistente técnico especializado.

► Para una mayor efectividad de CANDONGA[®] 1.8 EC, aplicar con **POTENZOL[®] 3000 SL** y para regular el pH y la dureza del agua usar **POTENZOL[®] pH-D**.