



CULTIVOS SANOS Y ALTA PRODUCTIVIDAD

Fungicida Agrícola

Suspensión Concentrada - SC

Registro Nacional ICA No. 818

Ingrediente activo:

Clorotalonil: 720 g/L

CENTAURO® 720 SC es un fungicida preventivo de amplio espectro, su acción fungicida se realiza por inhibición del proceso de respiración celular.

CULTIVOS	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS litro/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN	P.C.	P.R.
Papa	Gota o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.8 - 1.6*	Cada 7 a 15 días	14 días	4 horas
Tomate Uchuva, Lulo	Gota o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 - 3.0*	Cada 7 a 15 días	7 días	
Frijol	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	2.1	Desde floración	7 días	
Banano y plátano	Sigatoka amarilla (<i>Mycosphaerella musicola</i>) Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1.0 - 2.0*	Ciclos de 10 a 21 días	0 días	
Cebolla de bulbo Cebolla larga Puerro	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	2.0 - 2.2		7 días	
Ornamentales Rosa, Clavel Crisantemo Astromelia	Botrytis (<i>Botrytis cinerea Pers.</i>)	1.0 L/ha ó 1 ml/L de agua		No Aplica	
Tomate de Árbol	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloesporioides</i>) Gota o tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 - 2.0 1.5 - 3.0*		7 días	

* Utilizar la dosis menor con bajo nivel de inóculo y baja humedad relativa. Usar la dosis alta cuando las condiciones climáticas favorezcan la rápida diseminación del patógeno.

► Para una mayor efectividad de CENTAURO® 720 SC, aplicar con **POTENZOL® 3000 SL** y para regular el pH y la dureza del agua usar **POTENZOL® pH-D**.