



DOBLE ACCIÓN CONTRA LAS PLAGAS

Insecticida Agrícola

Suspensión Concentrada - SC

Registro Nacional ICA No. 1442

Ingredientes activos:

Thiamethoxam: 141 g/L

Lambdacialotrina: 106 g/L

REQUIEM® SC tiene acción por contacto e ingestión sobre el insecto. Ocasiona pérdida de control, parálisis y posterior muerte del insecto.

CULTIVOS	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	P.R.
Pasto Kikuyo	Chinche de los pastos (<i>Collaria scenica</i> Stal)	75 - 100 ml/ha. En un volumen de 600 L/ha	21 días	
Tomate	Gusano cogollero (<i>Tuta absoluta</i>)	300 ml/ha	3 días	12 horas
	Pasador del fruto (<i>Neoleucinodes elegantalis</i> Guenée)	400 ml/ha		
	Caracha (<i>Prodiplaxis longifila</i>)	300 ml/ha		
Berenjena, Lulo Tomate de árbol Pimentón	Pasador del fruto (<i>Neoleucinodes elegantalis</i> Guenée)	300 ml/ha		
Papa	Gusano blanco (<i>Premnatrypes vorax</i>)	0.5 L/ha	10 días	
	Comedor del follaje Pulguilla (<i>Epitrix cucumeris</i>)	100 ml/ha		
Arroz	Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	100 ml/ha	21 días	
Frijol	Trips (<i>Thrips palmi</i>)	0.5 L/ha	15 días	
Naranja, Limón Mandarina, Lima Tangelo, Toronja	Ortezia (<i>Praelongorthezia praelonga</i> Douglas)	0.25 L/ha	21 días	
	Psilido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i> Kuwayama)	0.150 L/ha		
Rosa, Crisantemo, Clavel, Gerberas, Alstromelias	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.8 L/ha	No aplica	4 horas
Café	Palomillas de la raíz (<i>Hemiptera: Coccoidea</i>)	0.3 L/ha	90 días	12 horas

► P.C.: Para el caso de potreros el P.C. es equivalente al P.E. (Período de reentrada del ganado al área tratada).

► Para una mayor efectividad de REQUIEM® SC, aplicar con **POTENZOL® 3000 SL** y para regular el pH y la dureza del agua usar **POTENZOL® pH-D**.