	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>CÓDIGO: FT-P-A-055</b>
	<b>PRODUCTO TERMINADO LINDERO 200 EC</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>	<b>VERSIÓN: 5</b>
	<b>I+D AGROQUÍMICOS</b>	<b>FECHA: 31/Jul/2020</b>

## 1. NOMBRE

**LINDERO 200 EC**, Registro Nacional ICA No. 1360

## 2. DESCRIPCIÓN

**LINDERO 200 EC** es un herbicida que tiene como ingrediente activo Fluroxypyr acido 200 g/L, equivalente a 288 g/L de Fluroxypyr meptyl.

## 3. CARACTERÍSTICAS

**LINDERO 200 EC** es un herbicida hormonal sistémico, derivado del ácido piridino carboxílico. Después de su aplicación, es rápidamente absorbido por las hojas y transportado a otras partes de la planta. Es selectivo a gramíneas, afectando el crecimiento por atrofia o malformación de los haces vasculares. Recomendado para el control de malezas en potreros.

## 4. ESPECIFICACIONES

### CARACTERÍSTICA DE CALIDAD: ESPECIFICACION

Aspecto físico: Líquido amarillo claro traslúcido

Densidad (g/ml): 0,95 – 0,99

Humedad (%): Menor del 1%


Emulsión: Estable según la NTC 292.

Contenido de Fluroxypyr Meptyl (g/L): 273.6-302

## 5. APLICACIONES Y USOS

Se debe efectuar una aplicación en etapa inicial de crecimiento de las malezas, bajo condiciones de buena humedad. Aplique **LINDERO® 200 EC** cuando las malezas estén en activo crecimiento, es decir una vez establecido el periodo de lluvias o cuando exista suficiente humedad en el suelo.

Las dosis de aplicación **LINDERO 200 EC** son:

	<b>FICHA TÉCNICA</b>		<b>CÓDIGO: FT-P-A-055</b>	
	<b>PRODUCTO TERMINADO LINDERO 200 EC</b>			
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>		<b>VERSIÓN: 5</b>	
	<b>I+D AGROQUÍMICOS</b>		<b>FECHA: 31/Jul/2020</b>	

CULTIVO	ARVENSES	DOSIS	P.C.	P.R.
POTREROS	Amor seco o Pega pega ( <i>Desmodium tortuosum</i> ) Escoba negra ( <i>Sida acuta</i> ) Escoba blanca ( <i>Sida rhombifolia</i> ) Cotorrera ( <i>Croton argenteus</i> )	1,0 L/ha	21 días*	0 horas
TRATAMIENTO POR TOCONEO	Pepa burro o burra de fruto ( <i>Xilopia aromatica</i> ) Limón ( <i>Citrus limon</i> ) Karate, Manca de mula o abrojo ( <i>Hydroles spinosa L.</i> ) Cafecito o Bicho hembra ( <i>Senna occidentalis (L.) Link</i> ) Guayabo de mico, Olleto o Coco de mico ( <i>Lecythis minor</i> )	0,6 L/ha (Equivalente a 1% de LINDERO® 200 EC En un volumen de aplicación de 60 L de mezcla/ha)		

P.C: período de carencia. Número de días entre la última aplicación y la cosecha. Para el caso de potreros el P.C. es equivalente al P.E.

(Período de reentrada del ganado al área tratada). P.R: período de reingreso al área tratada: 0 horas.

Mezclar la cantidad necesaria de **LINDERO® 200 EC** con agua limpia en el tanque de la aspersora. Calibre el equipo de aspersión antes de la aplicación.

## 6. PRESENTACIÓN

**LINDERO 200 EC** se ofrece al mercado en las presentaciones de 1, 4 y 20 litros.


## 7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

### ALMACENAMIENTO

Almacenar el **LINDERO 200 EC** bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado, en sus envases y empaques originales, debidamente cerrados y con su etiqueta adherida para evitar posibles deterioros y accidentes. No almacenar en casa de habitación ni almacenar o transportar cerca de alimentos para humanos y animales domésticos, fertilizantes, semillas y/o plaguicidas para evitar intoxicación y/o posteriores efectos en cultivos susceptibles a este tipo de herbicidas. **LINDERO 200 EC** tiene una fecha de vencimiento de 2 años.

### INDICACIONES DE MANEJO

7.1 Lea la etiqueta antes de usar el producto.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>CÓDIGO: FT-P-A-055</b>
	<b>PRODUCTO TERMINADO LINDERO 200 EC</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>	<b>VERSIÓN: 5</b>
	<b>I+D AGROQUÍMICOS</b>	<b>FECHA: 31/Jul/2020</b>

7.2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

7.3 Evite contaminar con **LINDERO 200 EC** las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano o para riego de cultivos.

7.4 En caso de contacto prolongado con la piel se pueden producir irritaciones. Cámbiese la ropa y los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la parte afectada.

7.5 Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo que la ropa antes de utilizarla de nuevo.

7.6 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

7.7 En caso de ingestión debe hacerse lavado gástrico y no inducir el vómito.

7.8 En caso de inhalación, trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado manteniéndola abrigada y en reposo.

7.9 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y déjelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

7.10 **LINDERO 200 EC** es un herbicida clasificado toxicológicamente como de CATEGORIA III, LIGERAMENTE PELIGROSO.


## 8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

## 9. GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> FT-P-A-055
	<b>PRODUCTO TERMINADO LINDERO 200 EC</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>	<b>VERSIÓN: 5</b>
	<b>I+D AGROQUÍMICOS</b>	<b>FECHA:</b> 31/Jul/2020

corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta, se verifico que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo a las indicaciones de empleo.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinadora Centro <b>Cargo:</b> Tecnológico Agroquímicos <b>Fecha:</b> 23/Jul/2020	<b>Cargo:</b> Representante De Ventas (Agro) <b>Fecha:</b> 27/Jul/2020  <b>Cargo:</b> Director Técnico <b>Fecha:</b> 29/Jul/2020	<b>Cargo:</b> Director Técnico <b>Fecha:</b> 29/Jul/2020  <b>Cargo:</b> Sistema De Gestión Integral <b>Fecha:</b> 31/Jul/2020